

ステップハイマグ

総合微量元素剤

商品番号
(4486)

芝生に必要な微量元素を含み、健全な芝生の生育を促します。微細粒なのでグリーンなど高度管理の芝地にも使用でき、微量元素の不足を容易に補う事ができます。

[登録保証値]

水溶性マンガ	2.3 %
水溶性苦土	12.0 %

その他成分

・鉄 (Fe)	1.95 %
・銅 (Cu)	0.67 %
・亜鉛 (Zn)	1.01 %
・イオウ成分 (S)	14.0 %

正味重量	20kg
粒径	0.7~2.0mm
使用可能刈高	刈高6mmまでの芝地 刈高6mm以上の芝地
施肥面積 (1袋)	約2,850~1,810㎡
効能期間 (施用量、温度、踏圧、芝刈高などにより異なります)	約6週間



実寸大

[特長]

1. ゴルフ場のグリーン、ティーや、競技場、校庭緑化、公園緑地などの芝地に使えます。
2. 芝生に必要なマグネシウム、マンガ、鉄、銅、亜鉛、イオウを含みます。
3. 効果は施用直後から約6週間持続します。(温度、踏圧、施用量、芝刈高などにより異なります)
4. マグネシウムを多く含み(12.0%)、鉄、マンガとの働きで葉色を鮮やかにします。
5. 新しく造成されるグリーン、ティー、競技場、校庭緑化などの芝地への微量元素の補給に便利です。
6. 微量元素が不足しがちなサンドグリーンなど、既存の芝地への微量元素の施用に最適です。

[使用方法]

1. 施用は、芝生の上へ均一にばらまいてください。肥料散布機の使用をおすすめします。
2. 施用後すぐに水やりをして、葉についている粒を落とし、土になじませてください。
これは、微量要素によるシミと芝刈機による粒の拾い上げを防ぐ為です。
3. **必ず乾いた葉へ施用してください。**濡れた葉に施用すると葉に黒っぽいシミや、施用直後に芝地に踏み込むと足跡が発生しやすくなります。もし、シミが発生しても生育には支障ありません。
4. 凍りつくような厳寒期や高温干ばつの時期の施用は避けてください。
5. 施用後約3日間は、粒が分散するまでバーチカルやグルーミングを遅らせてください。
6. 道路、コンクリートや衣服などに付着、またはこぼれた場合は直ちに掃き取り、除去してください。
放置しておくとしミの原因になります。
7. 再度施用が必要な場合には、6週間の間隔を設けてください。

[施用をおすすめする時期]

春	梅雨	夏	秋	冬
◎	○	△	◎	
更新作業(コアリング)前後			更新作業(コアリング)前後	

[施肥量]

	施用量(m ² 当り)	1袋当りの施用面積
少量施肥量	7.0g	約 4,000m ²
増量施肥量	11.0g	約 1,330m ²

注意: 施用量は、芝生の種類、生育状態、気象条件、土壌(土壌分析結果)、灌水方法などにより異なりますので、一つの目安としてお考えください。施用量は目安ですので、お試しのうえ、お使いください。

[ICL社 スプレッダー施肥目盛]

散布機	コーン目盛	施肥目盛(1m ² 当り散布量)					散布幅
		2.5g	5.0g	7.5g	10g	15g	
ロータリースプレッダー アキュプロ2000	7	G 1/2	H	I	I 1/2	K 1/2	4.3m

◎目盛りの合せ方 例「I 1/2」…IとJの間に目盛を合せてください。

- 注意
- ①施肥目盛、散布幅は、作業速度が毎分80m(時速 4.8km)を基準にしています。
 - ②風の強い日の散布は避けてください。
 - ③**必ず散布量、散布幅をご確認の上、お使いください。**
 - ④施肥量を正確に散布していただくために、散布前に目盛が調整されているかご確認ください。
 - ⑤上記の施用目盛、コーン目盛は、予告なく変更される場合があります。

⚠ 注意
<ul style="list-style-type: none"> ●食べ物ではありません。食べないでください。 ●子どもの手の届かないところ、ペット類が触れないところに保管してください。 ●目に入らないように注意してください。目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。 ●かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。 ●作業終了後は手や顔等を洗い、うがいをしてください。 ●施用量は目安ですので、お試しのうえお使いください。 施用量は芝生の種類、生育状況、気象条件、土壌(土壌分析結果)、灌水方法、踏圧などにより異なります。 ●使用後は密封し、直射日光や湿気を避けて保管してください。 ●農薬と混合すると化学変化を起こすことがありますので、別々にお使いください。 ●製品の性質上、いくぶん色合いが異なったり固まる場合があります。 ●使用済みの空袋は放置せず適切に廃棄してください。